Vass4R14s536-540

Vass4R14s536-540

FINA Collection Vassal-Montpellier

Se Showing vaid

0 SP. 02.07 .13 0Mtp646

Limnio noir

Vass4R14s536-540





Formulaire de description 2/8 (floraison)

Année: 2006 Code cépage

Code clone

Observateur:

Nom cépage: Limnio noir

Emplacement: 4 RAUSS36.540

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte D

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 2 - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5

forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte D- très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3cuivrées rougeâtre sur toute la surface

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne (3) - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 🗗 faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible ()- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible V- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera

notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 277 - moyenne 218 -

très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 226 fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8 (floraison) Année : Loo 4 Observateur: Code clone Code cépage Emplacement 4 RA4 \$536.540 Nom cépage : lunnio noir Rameau herbacé oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé/3)- horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 0 oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte D- verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge3 oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte B- verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence //- présence () oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence ?- présence 9. oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible? - moyenne 5 - forte 9 oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible - moyenne 5 fonte 9 oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons nulle on très faible 1 faible 3 moyenne 5)- forte 7 - très forte 9. oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - movenne - forte ou très forte 3 oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) 1) subcontinue ou continue (3 ou plus) 2 oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) ()- courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9. Inflorescence oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5. oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud D au-delà du 4° noeud 2 oiv 153 nombre inflorescence/rameau: I ou moins 1)- 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

Vassal:

hadaalaal

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 -

Couleur des vrilles verte 260 - jaune 261 - rouge 262 et 263

moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Nº d'ordre : Désignation :

Jaataalaati

Limnio moin 4R14A. 536.540A. 2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1/42 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge (64) partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long. 170 - moyen 1/1/- court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 1/76 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

-Calus 96

Formulaire de description 4/8 (entre stades nouaison et véraison) Année: 2004 Observateur: TD Code cépage: Code introduction: Emplacement: 4 R 14 D 536-540 Nom introduction: Timmo non Feuille adulte oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5. oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2) - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5. oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7. oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 32 révoluté 4 - tourmenté 5. oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 1 présente 9. oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 6 - présente 9. oiv 075 cloqûre face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) : nulle ou très faible 1 - faible D- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible O-faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

nulle ou très faible \mathcal{D} - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente & présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente & présente 9.

Pétiole
oiv 090 densité poils couchés: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
oiv 091 densité poils dressés: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane:

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Autre

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure:

nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure:

nulle ou très faible 6 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 Couleur du pétiole: vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 6.

[sinus pétiolaire: ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = 0-accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]
[sinus latéraux: ouverture = 1-2-3-4 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non]
[dents: forme = concave-rectiligne-rectiligne&ronde-ronde-crochue / taille = 1-3-5-7-9 / courtes-moy-longues]

dentarbarian kartan kartan l

Vassal: 000-11 axe de la rafle de la grappe : non color 2 - coloré 1.
000-18 région ombilicale : déprimée 1 - non déprimée 2

Millerandage: nul à très faible 1 – faible 3 – moyen 5 – fort 7 – très fort 9.

laataalaal

(après chute des feuilles)

Année: 2004

hadralant

Observateur: TD

Code cépage :

Code introduction:

oscivateur. ()

Nom introduction: Limnio more

Emplacement: 4R14 10536-340

ilmatordoorbootaataadsuutuud

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes / - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence y- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1- présence 9.

oiv 351 vigueur *: très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 100

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue :

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »